


# MENINGITIS MENINGOCÓCICA

## LO QUE DEBE SABER

LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA (MENINGITIS BACTERIANA) CAUSADA POR UNA BACTERIA (NEISSERIA MENINGITIDIS), AUNQUE POCO FRECUENTE, PUEDE DESARROLLARSE RÁPIDAMENTE Y SER POTENCIALMENTE MORTAL.

CAUSADA PRINCIPALMENTE POR 5 TIPOS:  
A-B-C-W-Y



## SÍNTOMAS

- FIEBRE ALTA  
REPERTINA
- SENSIBILIDAD A LA LUZ
- DOLOR DE CABEZA
- CUELLO RÍGIDO
- NÁUSEAS
- VÓMITOS
- CONFUSIÓN
- CONVULSIONES

## ESCANEE



SE PROPAGA A TRAVÉS DE SECRECIONES ORALES, TOS O BESOS, O CONTACTO PROLONGADO EN EL MISMO HOGAR.



SE NECESITAN DOS TIPOS DE VACUNAS CONTRA LA MENINGITIS PARA ESTAR COMPLETAMENTE VACUNADO.

- MenACWY: DOS DOSIS
  - PRIMERA DOSIS ENTRE LOS 11 Y 12 AÑOS
  - SEGUNDA DOSIS A LOS 16 AÑOS
- MenB: DOS DOSIS
  - PRIMERA DOSIS ENTRE LOS 16 Y 23 AÑOS
  - SEGUNDA DOSIS DE 1 A 6 MESES DESPUÉS DE LA PRIMERA

