


ပိုလီယိုအကြောသေရောဂါ

သင်သိရှိရန် လိုအပ်သည်များ

ပိုလီယိုအကြောသေရောဂါသည် ပိုလီယိုမိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်သော မသန်စွမ်းမှုဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ သေစေနိုင် သည့် ရောဂါဖြစ်သည်။ ဝမ်း-ပါးစပ် လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းပြီး နောက်ဆုံးတွင် လေဖြတ်ခြင်းအထိ ဖြစ်စေ နိုင်သော ကျောရိုးကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။



လက္ခဏာရပ်များ

- လည်ချောင်းနာခြင်း
- ဖျားခြင်း
- ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း
- မူးဝေခြင်း
- ခေါင်းကိုက်ခြင်း
- မိုက်နာခြင်း

စကဲန်ဖတ်ရန်

လက်များကို နှုတ်စွာ ဆေးကြောပါ။ အထူးသဖြင့် ရေအိမ် အသုံးပြုပြီးနောက် သို့မဟုတ် ကလေးသေးခံ လဲပြီးနောက်



ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် ၅ နှစ်အောက် ကလေး များကို ကူးစက်သည်။ ကုသဆေး မရှိသော်လည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်သည်။

- ပုံမှန် ကလေးဘဝ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း
- ၂၊ ၄၊ ၆-၁၈ လနှင့် ၄-၆ နှစ်များ

