

VARICELA

LO QUE DEBE SABER

EL VIRUS DE LA VARICELA ZÓSTER (VARICELA) ES UNA ENFERMEDAD VIRAL AGUDA Y MUY CONTAGIOSA.

PUEDE PERMANECER LATENTE EN EL SISTEMA NERVIOSO Y PROVOCAR BROTES DE HERPES ZÓSTER EN EL FUTURO.



SÍNTOMAS

- SARPULLIDO CON PICAZÓN/ AMPOLLAS
- ESCOZOR
- FIEBRE ALTA
- CANSANCIO
- PÉRDIDA DE APETITO
- DOLOR DE CABEZA

ESCANEE



SE PROPAGA A TRAVÉS DE LA TOS, LOS ESTORNUDOS Y EL CONTACTO FÍSICO.



VACUNA DE DOS DOSIS

- PRIMERA DOSIS:
ENTRE LOS 12 Y 15 MESES
- SEGUNDA DOSIS:
ENTRE LOS 4 Y 6 AÑOS



HERPES ZÓSTER

LO QUE DEBE SABER

ES CAUSADA POR EL MISMO VIRUS
QUE PROVOCA LA VARICELA
(VIRUS DE LA VARICELA ZÓSTER/VVZ).

CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA
RECUPERADO DE LA VARICELA PUEDE
CONTRAER HERPES ZÓSTER, INCLUSO
LOS NIÑOS.




SÍNTOMAS

- HORMIGUEO/ESCOZOR
- AMPOLLAS/SARPULLIDO
CON BULTOS
- PICAZÓN
- FATIGA
- SENSIBILIDAD A LA LUZ
- DOLOR DE CABEZA

ESCANEE



LAS PERSONAS QUE NUNCA TUVIERON VARICELA O
NO SE VACUNARON CONTRA LA VARICELA PUEDEN
CONTRAER EL VIRUS DE LA VARICELA ZÓSTER DE
ALGUIEN QUE TENGA HERPES ZÓSTER.




VACUNA DE DOS DOSIS (CON
UN INTERVALO DE 2 A 6 MESES)
RECOMENDADA PARA TODOS LOS
ADULTOS MAYORES DE 50 AÑOS
Y LAS PERSONAS MAYORES
DE 19 AÑOS CON SISTEMAS
INMUNITARIOS DEBILITADOS.



POLIO

LO QUE DEBE SABER

LA POLIOMIELITIS ES UNA ENFERMEDAD INCAPACITANTE, A VECES MORTAL, CAUSADA POR EL POLIOVIRUS. SE TRANSMITE POR VÍA FECAL-ORAL. PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS EN LA COLUMNA VERTEBRAL QUE, CON EL TIEMPO, PUEDEN PROVOCAR PARÁLISIS.



SÍNTOMAS

- DOLOR DE GARGANTA
- FIEBRE
- CANSANCIO
- NÁUSEAS
- DOLOR DE CABEZA
- DOLOR ESTOMACAL

ESCANEE



LÁVESE BIEN LAS MANOS, SOBRE TODO DESPUÉS DE IR AL BAÑO O CAMBIAR UN PAÑAL.



NORMALMENTE SE INFECTAN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. NO EXISTE CURA, PERO LA VACUNACIÓN PREVIENE.

VACUNACIÓN INFANTIL SISTEMÁTICA

- A LOS 2, 4 Y ENTRE LOS 6 Y 18 MESES, Y ENTRE LOS 4 Y 6 AÑOS



ROTAVIRUS

LO QUE DEBE SABER

EL ROTAVIRUS ES UN VIRUS MUY CONTAGIOSO QUE CAUSA GASTROENTERITIS EN BEBÉS Y NIÑOS.

SE CONTAGIA CUANDO ENTRA EN

LA BOCA MANOS, SUPERFICIES U OBJETOS CONTAMINADOS CON HECES.



SÍNTOMAS

- DIARREA
- VÓMITOS/MALESTAR ESTOMACAL
- TEMPERATURA ALTA
- DESHIDRATACIÓN GRAVE
- HECES NEGRAS O CON SANGRE
- IRRITABILIDAD
- SE MUEVE CON LENTITUD O
- NO REACCIONA

ESCANEE



LÁVESE BIEN LAS MANOS, SOBRE TODO DESPUÉS DE IR AL BAÑO O CAMBIAR UN PAÑAL.



NORMALMENTE SE INFECTAN NIÑOS ENTRE 6 Y 24 MESES DE EDAD.

VACUNACIÓN INFANTIL SISTEMÁTICA (VÍA ORAL)

- A LOS 2, 4 Y 6 MESES



MENINGITIS MENINGOCÓCICA

LO QUE DEBE SABER

LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA (MENINGITIS BACTERIANA) CAUSADA POR UNA BACTERIA (NEISSERIA MENINGITIDIS), AUNQUE POCO FRECUENTE, PUEDE DESARROLLARSE RÁPIDAMENTE Y SER POTENCIALMENTE MORTAL.

CAUSADA PRINCIPALMENTE POR 5 TIPOS:
A-B-C-W-Y



SÍNTOMAS

- FIEBRE ALTA
REPERTINA
- SENSIBILIDAD A LA LUZ
- DOLOR DE CABEZA
- CUELLO RÍGIDO
- NÁUSEAS
- VÓMITOS
- CONFUSIÓN
- CONVULSIONES

ESCANEE



SE PROPAGA A TRAVÉS DE SECRECIONES ORALES, TOS O BESOS, O CONTACTO PROLONGADO EN EL MISMO HOGAR.



SE NECESITAN DOS TIPOS DE VACUNAS CONTRA LA MENINGITIS PARA ESTAR COMPLETAMENTE VACUNADO.

- MenACWY: DOS DOSIS
 - PRIMERA DOSIS ENTRE LOS 11 Y 12 AÑOS
 - SEGUNDA DOSIS A LOS 16 AÑOS
- MenB: DOS DOSIS
 - PRIMERA DOSIS ENTRE LOS 16 Y 23 AÑOS
 - SEGUNDA DOSIS DE 1 A 6 MESES DESPUÉS DE LA PRIMERA




VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

LO QUE DEBE SABER

EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) ES UN VIRUS COMÚN QUE SE PROPAGA MUY FÁCILMENTE A TRAVÉS DEL CONTACTO ÍNTIMO PIEL CON PIEL.

MUCHAS PERSONAS SON ASINTOMÁTICAS, PERO AUN ASÍ PUEDEN INFECTAR A OTRAS. SE TRANSMITE PRINCIPALMENTE POR CONTACTO SEXUAL, PERO TAMBIÉN PUEDE CONTAGIARSE DE MADRE A HIJOS EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO.



SÍNTOMAS


- VERRUGAS GENITALES
- VERRUGAS CUTÁNEAS
- VERRUGAS EN LA LARINGE
- LESIONES ANALES
- PICAZÓN

ESCANEE




TIPOS DE CÁNCER:
CERVICAL, FARÍNGEO, ANAL, VULVAR, VAGINAL, DE PENE,
COLORRECTAL.

¡EL VPH NO ES SOLO ASUNTO DE MUJERES!
PROTÉJASE DEL CÁNCER.
LA VACUNACIÓN TEMPRANA ES MEJOR.



LA VACUNA HPV9 PROTEGE CONTRA SIETE CEPAS DEL VPH QUE PUEDEN CAUSAR CÁNCER Y DOS QUE CAUSAN VERRUGAS GENITALES.

- DOS DOSIS DE VACUNA SI SE COMIENZA ENTRE LOS 9 Y 14 AÑOS DE EDAD.
- TRES DOSIS DE VACUNA SI SE COMIENZA ENTRE LOS 15 Y 26 AÑOS DE EDAD.



HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B

LO QUE DEBE SABER

LA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (HIB) ES UNA ENFERMEDAD BACTERIANA QUE PUEDE PROVOCAR UNA INFECCIÓN POTENCIALMENTE MORTAL EN LOS NIÑOS PEQUEÑOS.

EN SU MAYORÍA AFECTA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

LA MENINGITIS ES LA ENFERMEDAD MÁS FRECUENTE RELACIONADA CON LA HIB.



SÍNTOMAS

- FIEBRE
- TOS
- ESCALOFRÍOS
- SUDORACIÓN
- DOLOR EN EL PECHO
- DOLOR DE CABEZA
- OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- DOLOR MUSCULAR
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR
- CANSANCIO EXCESIVO
- NEUMONÍA
- PÉRDIDA DE AUDICIÓN

ESCANEE




SE PROPAGA A TRAVÉS DE LA TOS, LOS ESTORNUDOS Y OTROS CONTACTOS CERCANOS. USTED TIENE EL PODER DE PROTEGERSE A SÍ MISMO Y A SUS SERES QUERIDOS.



VACUNACIÓN INFANTIL SISTEMÁTICA

- A LOS 2, 4, 6, Y ENTRE LOS 12 Y 15 MESES



NEUMOCOCO

LO QUE DEBE SABER

LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA DESCRIBE UN GRUPO DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR LA BACTERIA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE.

¡NO ES UN RESFRIADO NI UNA GRIPE!
SE TRANSMITE POR TOS O CONTACTO CERCANO.



SÍNTOMAS

- TOS
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR
- FIEBRE ALTA
- ESCALOFRÍOS (TEMBLORES)
- DOLOR EN EL PECHO
- NEUMONÍA
- MENINGITIS
- INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO

ESCANEE



¿QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO?
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, PERSONAS CON SISTEMAS INMUNITARIOS DEBILITADOS.



¡SE PUEDE PREVENIR LA NEUMONÍA CON LA VACUNACIÓN!

- PCV13/PCV15/PCV20
 - A LOS 2, 4, 6, Y ENTRE LOS 12 Y 15 MESES
- ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS O ADULTOS DE 19 A 64 AÑOS CON DETERMINADAS AFECCIONES MÉDICAS
 - PRIMERA DOSIS: PCV15/PCV20
 - SEGUNDA DOSIS: PPSV23



SARAMPIÓN

LO QUE DEBE SABER

EL SARAMPIÓN ES UNA ENFERMEDAD VIRAL MUY CONTAGIOSA.

¡NO ES SOLO UN PEQUEÑO SARPULLIDO!

EL SARAMPIÓN PUEDE SER PELIGROSO, ESPECIALMENTE PARA LOS NIÑOS. SI SOSPECHA QUE USTED O SU HIJO PUEDEN HABER ESTADO EXPUESTOS AL SARAMPIÓN, LLAME INMEDIATAMENTE A SU MÉDICO O A SU CENTRO DE SALUD.




SÍNTOMAS

- FIEBRE ALTA
- TOS
- GOTEOS NASAL
- OJOS ROJOS Y LLOROSOS
- SARPULLIDO
- MANCHAS EN LA BOCA

ESCANEE



SE PROPAGA A TRAVÉS DE LA TOS, LOS ESTORNUDOS Y EL CONTACTO CERCANO. EL SARAMPIÓN AVANZA CON RAPIDEZ. NOS COMPROMETEMOS A IR MÁS RÁPIDO.



SE NECESITAN DOS TIPOS DE VACUNAS CONTRA LA MENINGITIS PARA ESTAR COMPLETAMENTE VACUNADO.

- MenACWY: DOS DOSIS
 - PRIMERA DOSIS ENTRE LOS 11 Y 12 AÑOS
 - SEGUNDA DOSIS A LOS 16 AÑOS
- MenB: DOS DOSIS
 - PRIMERA DOSIS ENTRE LOS 16 Y 23 AÑOS
 - SEGUNDA DOSIS DE 1 A 6 MESES DESPUÉS DE LA PRIMERA



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE: WWW.CDC.GOV/CHICKENPOX


PAPERAS

LO QUE DEBE SABER

LAS PAPERAS SON UNA ENFERMEDAD VIRAL MUY CONTAGIOSA DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES, MÁS CONOCIDA POR CAUSAR HINCHAZÓN DOLOROSA EN LAS MEJILLAS.

MÁS QUE GLÁNDULAS INFLAMADAS. ¡LAS PAPERAS PUEDEN SER PELIGROSAS!

PUEDEN PROVOCAR SORDERA, INFECCIONES CEREBRALES (MENINGITIS) E INFLAMACIÓN DEL CEREBRO (ENCEFALITIS).




SÍNTOMAS

- FIEBRE
- GLÁNDULAS INFLAMADAS
- DOLORES DE CABEZA
- DOLORES MUSCULARES
- CANSANCIO
- PÉRDIDA DE APETITO

ESCANEE



SE PROPAGA A TRAVÉS DE LA TOS, LOS ESTORNUDOS Y EL CONTACTO CON SALIVA INFECTADA.
¡NO DEJE QUE LAS PAPERAS LE ARRUINEN LA DIVERSIÓN NI SUS FOTOS!



(MMR) VACUNA DE DOS
DOSIS PRIMERA DOSIS:
ENTRE LOS 12 Y 15 MESES
SEGUNDA DOSIS:
ENTRE LOS 4 Y 6 AÑOS




RUBÉOLA

LO QUE DEBE SABER

LA RUBÉOLA (SARAMPIÓN ALEMÁN) ES UNA INFECCIÓN VIRAL CONTAGIOSA.

SI UNA MUJER CONTRAE LA RUBÉOLA DURANTE EL EMBARAZO, PUEDE HABER GRAVES CONSECUENCIAS, COMO ABORTO, MUERTE FETAL, MORTINATALIDAD Y SÍNDROME DE LA RUBÉOLA CONGÉNITA.




SÍNTOMAS

- FIEBRE LEVE
- DOLOR DE CABEZA
- SARPULLIDO
- DOLOR MUSCULAR
- GANGLIOS LINFÁTICOS SENSIBLES
- CONJUNTIVITIS

ESCANEE



SE PROPAGA A TRAVÉS DE GOTITAS EN EL AIRE AL ESTORNUDAR O TOSER. LA RUBÉOLA AVANZA CON RAPIDEZ. NOS COMPROMETEMOS A IR MÁS RÁPIDO.



(MMR) VACUNA DE DOS DOSIS
PRIMERA DOSIS: ENTRE
LOS 12 Y 15 MESES
SEGUNDA DOSIS: ENTRE
LOS 4 Y 6 AÑOS



TOS FERINA

LO QUE DEBE SABER

LA TOS FERINA ES UNA INFECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES CAUSADA POR LA BACTERIA BORDETELLA PERTUSSIS.

CUALQUIER PERSONA QUE SOSPECHE QUE PUEDE TENER TOS FERINA DEBE AISLARSE Y BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA LO ANTES POSIBLE.



SÍNTOMAS

- SECRECIÓN O CONGESTIÓN NASAL
- ATAQUES DE TOS QUE PUEDEN SER INTENSOS O INCONTROLADOS Y PROVOCAR VÓMITOS
- FIEBRE DE BAJO GRADO (MENOS DE 100.4 F) O SIN FIEBRE
- APNEA (PAUSAS RESPIRATORIAS POTENCIALMENTE MORTALES) Y CIANOSIS (COLORACIÓN AZUL O MORADA) EN BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS

ESCANEE



LA VACUNA CONTRA LA TOS FERINA ES LA FORMA MÁS EFICAZ DE PREVENIR UNA ENFERMEDAD GRAVE A CUALQUIER EDAD.



- VACUNACIÓN INFANTIL SISTEMÁTICA (DTaP)
 - A LOS 2, 4, 6, Y ENTRE LOS 12 Y 23 MESES, Y ENTRE LOS 4 Y 6 AÑOS
- REFUERZO PARA ADOLESCENTES (Tdap)
 - ENTRE LOS 11 Y 12 AÑOS
- REFUERZO PARA ADULTOS (Tdap o Td)
 - CADA 10 AÑOS
- DURANTE CADA EMBARAZO



DIFTERIA

LO QUE DEBE SABER

LA DIFTERIA ES UNA ENFERMEDAD GRAVE CAUSADA POR UNA TOXINA QUE PRODUCE LA BACTERIA *CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE*.

LA DIFTERIA SE PROPAGA POR CONTACTO DIRECTO O A TRAVÉS DEL AIRE. LOS BROTES SON POCO FRECUENTES, PERO SIGUEN PRODUCIÉNDOSE ENTRE LA POBLACIÓN NO VACUNADA.



SÍNTOMAS

- SECRECIÓN NASAL
- DOLOR DE GARGANTA
- DEBILIDAD
- FIEBRE
- DOLOR DE CABEZA
- PIEL AZULADA
- CUELLO HINCHADO
- TOS SIMILAR A UN "LADRIDO"
- DOLOR AL TRAGAR
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR


ESCANEE



LA VACUNA CONTRA LA DIFTERIA ES LA FORMA MÁS EFICAZ DE PREVENIR UNA ENFERMEDAD GRAVE A CUALQUIER EDAD.



- VACUNACIÓN INFANTIL SISTEMÁTICA (DTaP)
 - A LOS 2, 4, 6, Y ENTRE LOS 12 Y 23 MESES, Y ENTRE LOS 4 Y 6 AÑOS
- REFUERZO PARA ADOLESCENTES (Tdap)
 - ENTRE LOS 11 Y 12 AÑOS
- REFUERZO PARA ADULTOS (Tdap o Td)
 - CADA 10 AÑOS
- DURANTE CADA EMBARAZO



TÉTANOS

LO QUE DEBE SABER

EL TÉTANOS ES CAUSADO POR LA BACTERIA PRODUCTORA DE TOXINAS CLOSTRIDIUM TETANI. ATACA AL SISTEMA NERVIOSO.

ES CAUSADO POR BACTERIAS DEL SUELO QUE PENETRAN EN LA PIEL A TRAVÉS DE UNA HERIDA PRODUCIDA POR OBJETOS CONTAMINADOS.




SÍNTOMAS

- ESPASMOS MUSCULARES
- FIEBRE
- DIFICULTAD PARA TRAGAR
- TAQUICARDIA
- INCONTINENCIA

ESCANEE



TRATAMIENTO INMEDIATO CON LIMPIEZA DE LA HERIDA, MEDICACIÓN E INYECCIÓN DE LA ANTITOXINA TETÁNICA.



- VACUNACIÓN INFANTIL SISTEMÁTICA (DTaP)
 - A LOS 2, 4, 6, Y ENTRE LOS 12 Y 23 MESES, Y ENTRE LOS 4 Y 6 AÑOS
- REFUERZO PARA ADOLESCENTES (Tdap)
 - ENTRE LOS 11 Y 12 AÑOS
- REFUERZO PARA ADULTOS (Tdap o Td)
 - CADA 10 AÑOS
- DURANTE CADA EMBARAZO



HEPATITIS B

LO QUE DEBE SABER

LA HEPATITIS B ES UNA ENFERMEDAD VIRAL GRAVE Y MORTAL QUE INFECTA A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES. ES UNA INFLAMACIÓN DEL HÍGADO.

SE TRANSMITE A TRAVÉS DE LA SANGRE, LOS FLUIDOS CORPORALES O DE LA MADRE AL BEBÉ. ES LA CAUSA PRINCIPAL DE CÁNCER DE HÍGADO. PUEDE SER UNA INFECCIÓN SILENCIOSA.



SÍNTOMAS

- FATIGA
- FALTA DE APETITO
- DOLOR ESTOMACAL
- NÁUSEAS
- ICTERICIA
- ORINA OSCURA

ESCANEE



LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B ES LA PRIMERA VACUNA PREVENTIVA CONTRA EL CÁNCER. SE RECOMIENDA INICIAR LA ADMINISTRACIÓN AL NACER.



VACUNACIÓN INFANTIL SISTEMÁTICA

- AL NACER, AL PRIMER MES
Y A LOS 6 MESES



HEPATITIS A

LO QUE DEBE SABER

LA HEPATITIS A ES UNA ENFERMEDAD VIRAL MUY CONTAGIOSA QUE INFECTA A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES. ES UNA INFLAMACIÓN DEL HÍGADO.

SE TRANSMITE A TRAVÉS DE ALIMENTOS O AGUA CONTAMINADOS. EL AUMENTO DE CASOS REGISTRADOS EN KENTUCKY SUPERÓ LA MEDIA DE 10 AÑOS DE CASOS DE HEPATITIS A NOTIFICADOS.




SÍNTOMAS

- FIEBRE
- VÓMITOS
- NÁUSEAS
- ICTERICIA
- DIARREA
- DOLOR ESTOMACAL

ESCANEE



USTED TIENE EL PODER DE PROTEGERSE A SÍ MISMO Y A SUS SERES QUERIDOS: ¡LA VACUNACIÓN ES SU MEJOR PROTECCIÓN!



VACUNACIÓN INFANTIL SISTEMÁTICA

- AL AÑO Y ENTRE LOS 6 Y 12 MESES DESPUÉS

