

# LA VARICELLE

CE QUE VOUS  
DEVEZ SAVOIR

LA VARICELLE (VIRUS DE LA VARICELLE ET DU ZONA) EST UNE MALADIE VIRALE AIGÛE ET TRÈS CONTAGIEUSE.

LE VIRUS DE LA VARICELLE EST CAPABLE DE RESTER EN DORMANCE DANS LE SYSTÈME NERVEUX ET POURRAIT ENTRAÎNER DES ÉRUPTIONS DE ZONA PLUS TARD DANS LA VIE.



## SYMPTÔMES

- ÉRUPTION CUTANÉE PRURIGINEUSE/ PHYCTÈNES
- SENSATION DE BRÛLURE
- FORTE FIÈVRE
- FATIGUE
- PERTE D'APPÉTIT
- MAUX DE TÊTE

SCANNEZ-MOI



PROPAGATION PAR LA TOUX,  
LES ÉTERNUEMENTS ET LE  
CONTACT PHYSIQUE



VACCIN À DEUX DOSES

- 1ÈRE DOSE : 12-15 MONTHS
- 2ÈME DOSE : 4-6 YEARS



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/CHICKENPOX](http://WWW.CDC.GOV/CHICKENPOX)

# LE ZONA

CE QUE VOUS  
DEVEZ SAVOIR

LE ZONA EST CAUSÉ PAR LE MÊME  
VIRUS QUE CELUI DE LA VARICELLE.  
(VIRUS DE LA VARICELLE ET  
DU ZONA/VZV)

TOUTE PERSONNE AYANT GUÉRI DE  
LA VARICELLE, MÊME LES ENFANTS,  
POURRAIT CONTRACTER LE ZONA.



## SYMPTÔMES

- PICOTEMENTS/SENSATION DE BRÛLURE
- FORMATION DE PHYCTÈNES/ÉRUPTION CUTANÉE BOSSELÉE
- DÉMANGEAISONS
- FATIGUE
- SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE
- MAUX DE TÊTE

SCANNEZ-MOI



LES PERSONNES N'AYANT JAMAIS EU LA VARICELLE  
OU QUI N'ONT PAS ÉTÉ VACCINÉES CONTRE LA  
VARICELLE POURRAIT ÊTRE INFECTÉES PAR LE VZV PAR  
L'INTERMÉDIAIRE D'UNE PERSONNE ATTEINTE DE ZONA.



LE VACCIN EN DEUX DOSES  
(À 2-6 MOIS D'INTERVALLE)  
EST RECOMMANDÉ À TOUS  
LES ADULTES ÂGÉS DE  
PLUS DE 50 ANS ET AUX  
PERSONNES ÂGÉES DE PLUS  
DE 19 ANS DONT LE SYSTÈME  
IMMUNITAIRE EST AFFAIBLI.




POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/SHINGLES](http://WWW.CDC.GOV/SHINGLES)

# LA POLIO

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LA POLIO EST UNE MALADIE INVALIDANTE, PARFOIS MORTELLE, CAUSÉE PAR LE POLIOVIRUS. ELLE EST TRANSMISE PAR VOIE ORO-FÉCALE ET PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS DE LA COLONNE VERTÉBRALE SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER UNE PARALYSIE.



## SYMPTÔMES

- MAL DE GORGE
- FIÈVRE
- FATIGUE
- NAUSÉE
- MAUX DE TÊTE
- DOULEURS ABDOMINALES

## SCANNEZ-MOI



SE LAVÉR SOIGNEUSEMENT LES MAINS, SURTOUT APRÈS ÊTRE ALLÉ AUX TOILETTES OU AVOIR CHANGÉ UNE COUCHE.



ATTEINT GÉNÉRALEMENT LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS. IL N'EXISTE AUCUN REMÈDE, MAIS LA VACCINATION PERMET DE PRÉVENIR LA MALADIE.

VACCINATION SYSTÉMATIQUE DES ENFANTS

- 2, 4, 6-18 MOIS ET 4-6 ANS



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/POLIO](http://WWW.CDC.GOV/POLIO)

# LE ROTAVIRUS

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LE ROTAVIRUS EST UN VIRUS TRÈS CONTAGIEUX QUI PROVOQUE DES GASTRO-ENTÉRITES CHEZ LES NOURRISSONS ET LES JEUNES ENFANTS.

IL PÉNÈTRE DANS LA BOUCHE PAR LES MAINS, LES SURFACES OU LES OBJETS CONTAMINÉS PAR DES MATIÈRES FÉCALES.



## SYMPTÔMES

- DIARRHÉE
- VOMISSEMENTS/MAL DE VENTRE
- TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
- DÉSHYDRATATION SÉVÈRE
- SELLES NOIRES OU SANG DANS LES SELLES
- IRRITABILITÉ
- MOUVEMENT LENT OU IMPOSSIBLE
- RÉPONDER

## SCANNEZ-MOI



SE LAVÉR SOIGNEUSEMENT LES MAINS, SURTOUT APRÈS ÊTRE ALLÉ AUX TOILETTES OU AVOIR CHANGÉ UNE COUCHE.



ATTEINT GÉNÉRALEMENT LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 24 MOIS.

VACCINATION SYSTÉMATIQUE DES ENFANTS (PAR VOIE ORALE)

- 2, 4 ET 6 MOIS



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/ROTAVIRUS](http://WWW.CDC.GOV/ROTAVIRUS)

# LA MÉNINGOCOCCIE

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

**MALADIE À MÉNINGOCOQUES  
(MÉNINGITE BACTÉRIENNE) CAUSÉE PAR  
UNE BACTÉRIE (NEISSERIA MENINGITIDIS).  
BIEN QUE RARE, ELLE POURRAIT SE  
DÉVELOPPER RAPIDEMENT ET DEVENIR  
POTENTIELLEMENT MORTELLE.**

**ELLE EST PRINCIPALEMENT CAUSÉE PAR  
5 TYPES DE BACTÉRIES :  
A-B-C-W-Y**



## SYMPTÔMES

- APPARITION SOUDAINE D'UNE FORTE FIÈVRE
- SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE
- MAUX DE TÊTE
- TORTICOLIS
- NAUSÉE
- VOMISSEMENTS
- CONFUSION
- CRISES D'ÉPILEPSIE

SCANNEZ-MOI



**SE TRANSMET PAR LES SÉCRÉTIONS  
ORALES DONT LA TOUX OU LES BAISERS,  
OU PAR UN CONTACT PROLONGÉ AU  
SEIN D'UN MÊME FOYER.**



**IL FAUT DEUX TYPES DE VACCINS  
CONTRE LA MÉNINGITE POUR ÊTRE  
COMPLÈTEMENT VACCINÉ.**

- **MENACWY : DEUX DOSES**
  - 1ÈRE DOSE À 11-12 ANS
  - 2ÈME DOSE À 16 ANS
- **MENB : DEUX DOSES**
  - 1ÈRE DOSE À 16-23 ANS
  - 2ÈME DOSE 1-6 MOIS APRÈS LA 1ÈRE



**POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/MENINGOCOCCAL](http://WWW.CDC.GOV/MENINGOCOCCAL)**

# LE VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LE VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN (VPH) EST UN VIRUS COURANT QUI SE PROPAGE TRÈS FACILEMENT PAR CONTACT INTIME DE PEAU À PEAU.

DE NOMBREUSES PERSONNES SONT ASYMPTOMATIQUES, MAIS ELLES POURRAIENT NÉANMOINS INFECTER D'AUTRES PERSONNES. IL SE TRANSMET PRINCIPALEMENT PAR CONTACT SEXUEL, MAIS IL POURRAIT ÉGALEMENT SE TRANSMETTRE DE LA MÈRE À L'ENFANT À LA NAISSANCE.

## SYMPTÔMES

- VERRUES GÉNITALES
- VERRUES CUTANÉES
- VERRUES AU NIVEAU DU LARYNX
- LÉSIONS ANALES
- DÉMANGEAISONS

## SCANNEZ-MOI




### TYPES DE CANCERS :

CANCER DU COL DE L'UTÉRUS, DE LA GORGE, DE L'ANUS, DE LA VULVE, DU VAGIN, DU PÉNIS, COLORECTAL.

LE VPH N'EST PAS SEULEMENT UNE MALADIE FÉMININE !

PROTÉGEZ-VOUS DU CANCER.

UNE VACCINATION PRÉCOCE EST PRÉFÉRABLE !



LE VACCIN 9-VALENT CONTRE LE VPH OFFRE UNE PROTECTION CONTRE 7 SOUCHES DE VPH QUI POURRAIENT CAUSER LE CANCER ET 2 QUI CAUSENT DES VERRUES GÉNITALES.

- SÉRIE DE DEUX DOSES SI LE VACCIN EST ADMINISTRÉ ENTRE 9 ET 14 ANS.
- SÉRIE DE TROIS DOSES SI LE VACCIN EST ADMINISTRÉ ENTRE 15 ET 26 ANS.



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/SHINGLES](http://WWW.CDC.GOV/SHINGLES)

# HAEMOPHILUS INFLUENZAE DE TYPE B

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

L'HAEMOPHILUS INFLUENZAE DE TYPE B (HIB) EST UNE MALADIE BACTÉRIENNE QUI PEUT ENTRAÎNER UNE INFECTION POTENTIELLEMENT MORTELLE CHEZ LES JEUNES ENFANTS.

ELLE TOUCHE PRINCIPALEMENT LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS. LA MÉNINGITE EST LA MALADIE LA PLUS COURANTE LIÉE À L'HIB.




## SYMPTÔMES

- FIÈVRE
- TOUX
- FRISSONS
- TRANSPARATION
- DOULEUR THORACIQUE
- MAUX DE TÊTE
- BLOCAGE DES VOIES RESPIRATOIRES
- DOULEURS MUSCULAIRES
- ESSOUFFLEMENT
- FATIGUE EXCESSIVE
- PNEUMONIE
- PERTE AUDITIVE

## SCANNEZ-MOI



PROPAGATION PAR LA TOUX, LES ÉTERNUEMENTS ET AUTRES CONTACTS ÉTROITS. VOUS AVEZ LE POUVOIR DE VOUS PROTÉGER, AINSI QUE CEUX QUE VOUS AIMEZ !



VACCINATION SYSTÉMATIQUE DES ENFANTS

- 2, 4, 6 ET 12-15 MOIS



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE : [WWW.CDC.GOV/HI-DISEASE](http://WWW.CDC.GOV/HI-DISEASE)

# LE PNEUMOCOQUE

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LES INFECTIONS À PNEUMOCOQUES DÉCRIVENT UN GROUPE DE MALADIES CAUSÉES PAR LA BACTÉRIE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE.

IL NE S'AGIT PAS D'UN RHUME OU D'UNE GRIPPE !

ELLES SE TRANSMETTENT PAR LA TOUX OU PAR CONTACT ÉTROIT.



## SYMPTÔMES

- TOUX
- TROUBLES RESPIRATOIRES
- FORTE FIÈVRE
- GROS FRISSONS
- DOULEUR THORACIQUE
- PNEUMONIE
- MÉNINGITE
- INFECTION DU SANG

## SCANNEZ-MOI



## QUI EST À RISQUE ?

LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS, LES PERSONNES ÂGÉES, LES PERSONNES SOUFFRANT DE MALADIES CHRONIQUES, LES PERSONNES DONT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE EST AFFAIBLI.



## PRÉVENIR LA PNEUMONIE PAR LA VACCINATION !

- PCV13/PCV15/PCV20
  - 2, 4, 6 ET 12-15 MOIS
- ADULTES ÂGÉS DE 65 ANS OU PLUS OU ADULTES ÂGÉS DE 19 À 64 ANS ATTEINTS DE CERTAINES AFFECTIONS
  - 1ÈRE DOSE PCV15/PCV20
  - 2ÈME DOSE PPSV23



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/PNEUMOCOCCAL](http://WWW.CDC.GOV/PNEUMOCOCCAL)



# LA ROUGEOLE

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LA ROUGEOLE EST UNE MALADIE VIRALE TRÈS CONTAGIEUSE.

CE N'EST PAS QU'UNE PETITE ÉRUPTION CUTANÉE !

LA ROUGEOLE POURRAIT ÊTRE DANGEREUSE, SURTOUT POUR LES ENFANTS. SI VOUS OU VOTRE ENFANT AVEZ ÉTÉ EXPOSÉ À LA ROUGEOLE, APPELEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN OU VOTRE CLINIQUE.




## SYMPTÔMES

- FORTE FIÈVRE
- TOUX
- ÉCOULEMENT NASAL
- YEUX ROUGES ET LARMOYANTS
- ÉRUPTION CUTANÉE
- TACHES À L'INTÉRIEUR DE LA BOUCHE

SCANNEZ-MOI



PROPAGATION PAR LA TOUX, LES ÉTERNUEMENTS ET LES CONTACTS ÉTROITS. LA ROUGEOLE SE PROPAGE RAPIDEMENT NOUS NOUS ENGAGEONS À AGIR PLUS VITE !



IL FAUT DEUX TYPES DE VACCINS CONTRE LA MÉNINGITE POUR ÊTRE COMPLÈTEMENT VACCINÉ.

- MENACWY : DEUX DOSES
  - 1ÈRE DOSE À 11-12 ANS
  - 2ÈME DOSE À 16 ANS
- MENB : DEUX DOSES
  - 1ÈRE DOSE À 16-23 ANS
  - 2ÈME DOSE 1-6 MOIS APRÈS LA 1ÈRE



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/MEASLES](http://WWW.CDC.GOV/MEASLES)

# LES OREILLONS

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LES OREILLONS SONT UNE MALADIE VIRALE TRÈS CONTAGIEUSE DES GLANDES SALIVAIRES, CONNUE POUR PROVOQUER UNE ENFLURE DOULOUREUSE AU NIVEAU DES JOUES.

AU-DELÀ DE L'ENFLURE DES GLANDES GONFLÉES, LES OREILLONS POURRAIENT ÊTRE DANGEREUX.

ILS POURRAIENT ENTRAÎNER LA SURDITÉ, DES INFECTIONS DU CERVEAU (MÉNINGITE) ET UN GONFLEMENT DU CERVEAU (ENCÉPHALITE).




## SYMPTÔMES

- FIÈVRE
- ENFLURE DES GLANDES
- MAUX DE TÊTE
- DOULEURS MUSCULAIRES
- FATIGUE
- PERTE D'APPÉTIT

## SCANNEZ-MOI



PROPAGATION PAR LA TOUX, LES ÉTERNUEMENTS ET LE CONTACT AVEC DE LA SALIVE INFECTÉE.  
NE LAISSEZ PAS LES OREILLONS GÂCHER VOTRE PLAISIR OU VOS SELFIES !



(MMR) VACCIN À DEUX DOSES  
1ÈRE DOSE : 12-15 MONTHS  
2ÈME DOSE : 4-6 YEARS




POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/MUMPS](http://WWW.CDC.GOV/MUMPS)

# LA RUBÉOLE

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LA RUBÉOLE EST UNE INFECTION VIRALE CONTAGIEUSE.

SI UNE FEMME ENCEINTE CONTRACTE LA RUBÉOLE, DE GRAVES CONSÉQUENCES POURRAIENT EN RÉSULTER, NOTAMMENT DES FAUSSES COUCHES, DES MORTS FŒTALES, DES MORT-NÉS ET LE SYNDROME DE RUBÉOLE CONGÉNITALE.




## SYMPTÔMES

- FIÈVRE LÉGÈRE
- MAUX DE TÊTE
- ÉRUPTION CUTANÉE
- DOULEURS MUSCULAIRES
- GANGLIONS LYMPHATIQUES SENSIBLES
- CONJONCTIVITE

## SCANNEZ-MOI



SE PROPAGE PAR DES GOUTTELETTES EN SUSPENSION DANS L'AIR LORSQUE DES PERSONNES ÉTERNUENT OU TOUSSENT.  
LA RUBÉOLE SE PROPAGE RAPIDEMENT  
NOUS NOUS ENGAGEONS À AGIR PLUS VITE !



(MMR) VACCIN À DEUX DOSES  
1ÈRE DOSE : 12-15 MONTHS  
2ÈME DOSE : 4-6 YEARS

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/RUBELLA](http://WWW.CDC.GOV/RUBELLA)



# LA COQUELUCHE

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LA COQUELUCHE EST UNE INFECTION DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES CAUSÉE PAR LA BACTÉRIE BORDETELLA PERTUSSIS.

TOUTE PERSONNE SUSPECTANT UNE COQUELUCHE DEVRAIT S'ISOLER ET RECHERCHER DES SOINS MÉDICAUX DÈS QUE POSSIBLE.



## SYMPTÔMES

- ÉCOULEMENT NASAL OU NEZ BOUCHÉ
- DES QUINTES DE TOUX QUI POURRAIENT ÊTRE VIOLENTES OU INCONTRÔLÉES ET ENTRAÎNER DES VOMISSEMENTS
- FIÈVRE LÉGÈRE (INFÉRIEURE À 100,4 °F) OU ABSENCE DE FIÈVRE
- APNÉE (PAUSES RESPIRATOIRES POTENTIELLEMENT MORTELLES) ET CYANOSE (LE FAIT DE DEVENIR BLEU OU VIOLET) CHEZ LES BÉBÉS ET LES JEUNES ENFANTS.

## SCANNEZ-MOI



LA VACCINATION OFFRE UNE PROTECTION CONTRE LA COQUELUCHE ET CONSTITUE LE MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR PRÉVENIR LES MALADIES GRAVES À TOUT ÂGE.



- VACCINATION SYSTÉMATIQUE DES ENFANT (DTCa)
  - 2, 4, 6, 12-23 MOIS ET 4-6 ANS
- RAPPEL POUR LES ADOLESCENTS (DTCa)
  - À 11-12 ANS
- RAPPEL POUR LES ADULTES (DTCa OU TD)
  - UNE FOIS TOUS LES 10 ANS.
- À CHAQUE GROSSESSE



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/PERTUSSIS](http://WWW.CDC.GOV/PERTUSSIS)

# LA DIPHTÉRIE

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LA DIPHTÉRIE EST UNE MALADIE GRAVE CAUSÉE PAR UNE TOXINE PRODUITE PAR LA BACTÉRIE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE.

LA DIPHTÉRIE SE TRANSMET PAR CONTACT DIRECT OU PAR VOIE AÉRIENNE. LES ÉPIDÉMIES SONT RARES MAIS SURVIENNENT TOUJOURS PARI MI LES POPULATIONS NON VACCINÉES.



## SYMPTÔMES

- ÉCOULEMENT NASAL
- MAL DE GORGE
- FAIBLESSE
- FIÈVRE
- MAUX DE TÊTE
- PEAU BLEUÂTRE
- COU ENFLÉ
- TOUX RAUQUE
- ODYNOPHAGIE
- TROUBLES RESPIRATOIRES

## SCANNEZ-MOI



LA VACCINATION OFFRE UNE PROTECTION CONTRE LA DIPHTÉRIE ET CONSTITUE LE MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR PRÉVENIR LES MALADIES GRAVES À TOUT ÂGE.



JE ♥ MÊ SUI S  
FAIT(E)  
VACCINER.

- VACCINATION SYSTÉMATIQUE DES ENFANT (DTCa)
  - 2, 4, 6, 12-23 MOIS ET 4-6 ANS
- RAPPEL POUR LES ADOLESCENTS (DTCa)
  - À 11-12 ANS
- RAPPEL POUR LES ADULTES (DTCa OU TD)
  - UNE FOIS TOUS LES 10 ANS.
- À CHAQUE GROSSESSE



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/DIPHTHERIA](http://WWW.CDC.GOV/DIPHTHERIA)

# LE TÉTANOS

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LE TÉTANOS EST CAUSÉ PAR LA BACTÉRIE CLOSTRIDIUM TETANI QUI PRODUIT DES TOXINES. ELLE ATTAQUE LE SYSTÈME NERVEUX.

LE TÉTANOS EST CAUSÉ PAR DES BACTÉRIES PRÉSENTES DANS LE SOL QUI PÉNÈTRENT DANS LA CHAIR PAR LE BIAIS D'UNE BLESSURE CAUSÉE PAR DES OBJETS CONTAMINÉS.



## SYMPTÔMES

- SPASMES MUSCULAIRES
- FIÈVRE
- TROUBLES DE LA DÉGLUTITION
- RYTHME CARDIAQUE RAPIDE
- INCONTINENCE

## SCANNEZ-MOI



TRAITEMENT IMMÉDIAT AVEC NETTOYAGE DE LA PLAIE, MÉDICAMENTS ET INJECTION D'ANTITOXINE TÉTANIQUE.



- VACCINATION SYSTÉMATIQUE DES ENFANT (DTCa)
  - 2, 4, 6, 12-23 MOIS ET 4-6 ANS
- RAPPEL POUR LES ADOLESCENTS (DTCa)
  - À 11-12 ANS
- RAPPEL POUR LES ADULTES (DTCa OU TD)
  - UNE FOIS TOUS LES 10 ANS.
- À CHAQUE GROSSESSE



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/TETANUS](http://WWW.CDC.GOV/TETANUS)

# L'HÉPATITE B :

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

L'HÉPATITE B EST UNE MALADIE VIRALE GRAVE ET MORTELLE QUI INFECTE DES PERSONNES DE TOUS ÂGES. IL S'AGIT D'UNE INFLAMMATION DU FOIE.

ELLE SE TRANSMET PAR LE SANG OU LES FLUIDES CORPORELS, OU DE LA MÈRE À L'ENFANT. PRINCIPALE CAUSE DU CANCER DU FOIE. POURRAIT ÊTRE UNE INFECTION SILENCIEUSE.



## SYMPTÔMES

- FATIGUE
- PERTE D'APPÉTIT
- DOULEURS ABDOMINALES
- NAUSÉE
- JAUNISSE
- URINES FONCÉES

SCANNEZ-MOI




LE VACCIN CONTRE L'HÉPATITE B CONSTITUE LE PREMIER VACCIN PRÉVENTIF CONTRE LE CANCER. IL EST RECOMMANDÉ DE COMMENCER LA SÉRIE DE VACCINS À LA NAISSANCE.



VACCINATIONS SYSTÉMATIQUES  
DES ENFANTS

- 0, 1 ET 6 MOIS



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/HEPATITIS/HBV](http://WWW.CDC.GOV/HEPATITIS/HBV)

# L'HÉPATITE A

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

L'HÉPATITE A EST UNE MALADIE VIRALE TRÈS CONTAGIEUSE QUI INFECTE DES PERSONNES DE TOUS ÂGES. IL S'AGIT D'UNE INFLAMMATION DU FOIE.

ELLE SE TRANSMET PAR L'INTERMÉDIAIRE D'ALIMENTS ET DE L'EAU CONTAMINÉS. L'AUGMENTATION DES CAS OBSERVÉE AU KENTUCKY A DÉPASSÉ LA MOYENNE DES CAS D'HÉPATITE A DÉCLARÉS SUR 10 ANS.




## SYMPTÔMES

- FIÈVRE
- VOMISSEMENTS
- NAUSÉE
- JAUNISSE
- DIARRHÉE
- DOULEURS ABDOMINALES

## SCANNEZ-MOI



VOUS AVEZ LE POUVOIR DE VOUS PROTÉGER, AINSI QUE CEUX QUE VOUS AIMEZ ! LA VACCINATION CONSTITUE VOTRE MEILLEURE DÉFENSE !



## VACCINATIONS SYSTÉMATIQUES DES ENFANTS

- À 1 AN ET À 6-12 MOIS APRÈS



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :  
[WWW.CDC.GOV/HEPATITIS/HAV](http://WWW.CDC.GOV/HEPATITIS/HAV)